

لقاح أسترازينيكا (AstraZeneca) المضاد لكوفيد-19

معلومات للأشخاص الذين يتلقون اللقاح

رسمي

حول اللقاح

يمكن للقاح كوفيد-19 AstraZeneca منع الناس من الإصابة بكوفيد-19. يحتوي اللقاح على الشفرة الجينية لجزء من الفيروس المسبب لكوفيد-19 ويُسمى بروتين الحسكة (spike protein). لا يمكنكم الإصابة بكوفيد-19 من اللقاح.

بعد الحصول على اللقاح، يصنع جسمكم نُسخًا من بروتين الحسكة، والذي يتعلم جهازكم المناعي التعرف عليه. ويساعدكم هذا على محاربة الفيروس المسبب لكوفيد-19.

يتم إعطاء اللقاح على جرعتين، يفصل بينهما حوالي 12 أسبوعًا.

إن التطعيم طوعي. للحفاظ على سلامة الجميع من كوفيد-19، نحن نشجّع كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق على أخذ اللقاح، مع استثناءات قليلة. إذا كان لديكم أي أسئلة حول اللقاح تحدثوا إلى مُقدّم التطعيم الخاص بكم أو طبيبيكم (الطبيب العام).

فوائد اللقاح

أظهرت الأبحاث أن لقاح أسترازينيكا (AstraZeneca) المضاد لكوفيد-19 يمكن أن يمنع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق من الإصابة بكوفيد-19. كما أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم هم أيضًا أقل عرضة للذهاب إلى المستشفى إذا أصيبوا بكوفيد-19.

ستكونون محميين من كوفيد-19 من 2 إلى 3 أسابيع بعد الجرعة الأولى. توفر الجرعة الواحدة حماية كبيرة على المدى القصير وتوفر الجرعتان أفضل حماية. لا نعرف حتى الآن إلى متى ستستمر الحماية من لقاح كوفيد-19 AstraZeneca. وستعلم المزيد عن هذا بمرور الوقت.

لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100 في المائة، لذلك لا يزال من الممكن أن تصابوا بكوفيد-19 وتنتقلون الفيروس للآخرين بعد التطعيم.

ولهذا السبب من المهم الالتزام بسلوكيات كوفيد الأمنة، مثل:

- الابتعاد 1.5 متر عن الناس
- غسل أيديكم بانتظام
- ارتداء الكمامة عند الحاجة
- الخضوع للفحص والبقاء في المنزل إذا كان لديكم أي أعراض لكوفيد-19، مهما كانت خفيفة.

أعراض كوفيد-19 التي يجب الانتباه لها هي الحمى والقشعريرة أو التّعرق والسعال وألم في الحلق وضيق في التنفس وسيلان الأنف وفقدان أو تغيير حاسة الشم أو التذوق. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الصداع ووجع العضلات وانسداد الأنف والغثيان والقيء والإسهال.

من يمكنه الحصول على هذا اللقاح

يمكن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق الحصول على لقاح كوفيد-19 AstraZeneca.

يمكن لمقدّم الرعاية الصحية الخاص بكم مساعدتكم في اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب عليكم الحصول على التطعيم. تحدثوا إلى مقدّم الرعاية الصحية الخاص بكم إذا:

- كنتم تعانيون من ضعف في جهاز المناعة
- كنتم حامل أو مرضعة أو تخططين للحمل
- أصبتم بكوفيد-19

• كنتم تعانيون من اضطرابات النزيف أو كنتم تتناولون دواء مضاد لتخثر الدم (مضاد للتخثر).

يجب ألا تحصلوا على لقاح AstraZeneca إذا عانيتم من الصدمة التأقية (الحساسية المفرطة وهي رد فعل تحسسي شديد وخطير):

- نتيجة جرعة سابقة من نفس نوع لقاح كوفيد-19، أو
- بعد التعرض لأي مكوث من لقاح كوفيد-19.

إذا كنتم قد عانيتم سابقاً من رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مادة أخرى، أو إذا كنتم تستخدمون حاقن الأدرينالين التلقائي (على سبيل المثال، EpiPen)، فستحتاجون إلى البقاء لمدة 30 دقيقة بعد أخذ اللقاح للتأكد من أنكم لا تعانيون من رد فعل تحسسي

الأطفال

تمت الموافقة على لقاح كوفيد-19 AstraZeneca فقط للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر. لا يمكن إعطاؤه للأشخاص الصغار. يتم حالياً اختبار اللقاح على الأطفال الأكبر سناً، لكن لم يحصل على النتائج بعد.

إن خطر الإصابة بكوفيد-19 عند الأطفال أقل منه لدى البالغين، وخاصة خطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

الحصول على التطعيم

كما هو الحال مع أي لقاح، سوف يقوم مقدم اللقاح الخاص بكم بالإطمئنان عليكم لفترة قصيرة بعد أخذ اللقاح للتأكد من أنكم على ما يرام. بالنسبة لمعظم الناس، ستكون هذه المدة بضعة دقائق فقط.

قد تشعرون بألم أو احمرار أو تورم عند أخذ الحقنة أو حمى خفيفة أو صداع.

إذا كان لديكم أي آثار جانبية، فيرجى إخبار مقدم التطعيم الخاص بكم أو أخصائيي آخر في الرعاية الصحية. يمكنكم أيضاً الرد على الرسائل القصيرة التي تتلقونها بعد تلقي اللقاح.

سلامة اللقاح

الحكومة الأسترالية مسؤولة عن الموافقة على لقاحات كوفيد-19 وشرائها. تقوم إدارة السلع العلاجية (TGA) بتقييم جميع اللقاحات في أستراليا. ولكي تتم الموافقة على اللقاح، يجب أن يكون آمناً وفعالاً ومُصنَّعاً وفقاً لمعايير جودة عالية جداً.

تم التأكد من أن لقاح كوفيد-19 AstraZeneca آمن وفعال من خلال التجارب السريرية الكبيرة التي شملت حوالي 17000 شخص. وتم تطوير لقاح كوفيد-19 AstraZeneca ولقاحات كوفيد-19 الأخرى بسرعة وبأمان. وقد كان هذا ممكناً بسبب زيادة التمويل لأبحاث اللقاحات والأعداد الكبيرة من المتطوعين للدراسات البحثية.

تتم مراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 بشكل مستمر.

لتلقي هذه الوثيقة بتنسيق آخر، اتصلوا على الرقم 1300 651 160، وإذا كنتم تستخدمون National Relay Service اتصلوا على الرقم 13 36 77 إذا لزم الأمر، أو أرسلوا بريداً إلكترونياً إلى COVIDvaccination@dhs.vic.gov.au

مصرح بها ومنشورة من قبل حكومة فيكتوريا، 1 Treasury Place، ملبورن.

© ولاية فيكتوريا، أستراليا، دائرة الصحة، آذار/مارس 2021.